

 Centre Médical de La Côte

Dr Pierre Kaeser

Médecine interne FMH

Maladies allergiques et immunologie clinique

Tél. 032 727 11 85 Fax. 032 727 11 88

Monsieur
Hannes Jacob
Fg de l'Hôpital 13
2000 NEUCHÂTEL

Corcelles, le 14 janvier 2019

Avec les compliments du Dr Kaeser

Dr Pierre Kaeser

Médecine interne FMH

Maladies allergiques et immunologie clinique

Tél. 032 727 11 85 Fax. 032 727 11 88

COPIE

Monsieur le Docteur
Cyril Jeanneret
Grand-Rue 10
2035 CORCELLES

Corcelles, le 14 janvier 2019

Enfant [REDACTED] Zoé, née le [REDACTED]

Cher Ami,

J'ai revu ta patiente susnommée à ma consultation le 19.12.2018 et pratiqué, chez elle, un test de provocation avec le kiwi, le 12.01.2019.

Diagnostics :

- **Status après réaction anaphylactique de stade IV selon Müller sur hypersensibilité au kiwi.**
- **Sensibilisation au sésame et à la banane.**
- **Dermatite atopique.**

Discussion et évaluation du cas :

Je ne reviens pas en détail sur les antécédents de cette patiente qui sont résumés dans mes lettres précédentes.

Elle avait présenté, en 2016, une réaction anaphylactique très sévère avec des vomissements profus, une urticaire disséminée, puis une lipothymie qui l'avait amenée aux urgences de Pourtalès. Elle venait d'ingérer un kiwi et les examens paracliniques ont objectivé, à ce moment-là, une forte allergie au kiwi. Il n'y avait fort heureusement pas d'allergie croisée au latex et les tests ont mis en évidence une sensibilisation à la banane et au sésame que la patiente tolère par ailleurs parfaitement.

La maman de Zoé a décidé d'aller consulter M. Hannes Jacob qui a pratiqué une thérapie de type EPI avec, au niveau des tests, une disparition du test cutané au kiwi et une diminution spectaculaire du dosage d'IgE spécifiques dirigés contre le kiwi.


Nous avons donc décidé de pratiquer un test de provocation orale sur 2 heures, sous surveillance stricte à la permanence, test au cours duquel Zoé a ingéré un kiwi entier sans présenter la moindre manifestation compatible avec une quelconque réaction allergique. Elle peut donc, à mon avis, ingérer désormais du kiwi à volonté ce qui semble l'enchanter.

Force est donc de constater que l'approche thérapeutique choisie par M. Hannes Jacob s'est révélée efficace dans ce cas précis.

En te remerciant de ta confiance et en restant à disposition pour tout renseignement complémentaire, je t'adresse, Cher Ami, mes salutations amicales.

Classe 1 - faible
Classe 2 - modérée
Classe 3 - importante
Classe 4 - sévère
Classe 5 - très sévère

Date :
Nom patient(e) :
Date de naissance :



Dr Pierre Kaeser

Tests effectués : Classe Concentration (40.35 kUA/L)

Tests effectués	Classe (0 à 5)	Concentration (40.35 kUA/L)
f110 SéSAME	0	0.00
f34 Kiwi	2	1.02
f92 Banane	1	0.40
f430 Kiwi (PR-10)	2	0.98
f420 Pêche (LTP)	0	0.00
f425 Noisette (Cox-A8)	0	0.00
f82 Latex	0	0.00

RESULTATS DES DOSAGES IgE SPECIFIQUES PAR CAP-RAST FEIA

Dr Pierre KAESER
Médecine interne FMH
Spéc. Maladies allergiques
et immunologie clinique
Petit Berne 14
Centre Medical de la Côte
2035 Corcelles

Classe 0 : pas d'allergie
Classe 1 : faible
Classe 2 : modérée
Classe 3 : moyenne
Classe 4 : importante
Classe 5 : sévère
Classe 6 : très sévère

Date : 19.12.2018
Nom patient(e) : [REDACTED] Zoé
Date de naissance : [REDACTED]

Tests effectués	Classe (0 à 6)	Concentration (<0.35 kUA/l.)
-----------------	-------------------	---------------------------------

f10	Sésame	0	0.00
f94	Kiwi	2	1.02
f92	Banane	1	0.40
f430	Kiwi (PR-10)	2	0.98
f420	Pêche (LTP)	0	0.00
f425	Noisette (Cor-A8)	0	0.00
k82	Latex	0	0.00